

令和2年10月1日から「ロタウイルスワクチン」は“定期接種”になります！

# ロタウイルスワクチンを接種しましょう



## 🌸ロタウイルスによる胃腸炎とは？

ロタウイルスによって引き起こされる急性の胃腸炎で、乳幼児期（0～6歳頃）にかかりやすい病気です。ロタウイルスは感染力が強く、乳幼児は特に初めて感染したときに強く症状が出ます。主な症状は、水のような下痢、吐き気、嘔吐、発熱、腹痛です。脱水がひどくなると点滴や入院が必要になることがあります。


## 🌸2種類のワクチンがあります

『**ロタテック**（5価経口弱毒性生ロタワクチン）』と『**ロタリックス**（経口弱毒性生ヒトロタウイルスワクチン）』の2種類があり、同様の効果があります。ロタテックは3回接種、ロタリックスは2回接種です。どちらかのワクチンを選び、同じ種類で決められた回数の接種をしましょう。

どちらも出生6週0日後から接種を受けることができます。1回目の接種の標準接種期間は生後2か月から生後14週6日までです。初回接種を出生15週0日以降に受けることは、腸重積症にかかりやすくなるという安全性の観点からおすすめしていません。

### \*接種スケジュール\*

【注意！】腸重積症を予防するため、1回目は生後14週6日までに受けてください



## 🌸接種後1～2週間は「腸重積症」に注意しましょう！

### 腸重積症とは？

腸の一部が接している腸管にはまり込む病気で、ワクチンの接種にかかわらず3か月～2歳くらいまでの赤ちゃんがかかりやすい病気です。ワクチンの接種後（特に初回接種後）1～2週間はかかりやすくなると報告されています。

### 接種後は以下の症状が一つでも見られたら医療機関を受診しましょう

- 「突然はげしく泣く」
- 「嘔吐を繰り返す」
- 「便に血が混じる」
- 「ぐったりして顔色が悪い」
- 「機嫌が良かったり不機嫌になったりを繰り返す」

\*お問い合わせ先\*

泊村役場 保健福祉課 健康づくり係 保健師

TEL (0135) 75-2134